

San Diego Gastroenterology Medical Associates

A Medical Corporation

Robert Epstein, MD; Kevin Haynes, MD; Gary de la Pena, MD; Suja DuBois, MD Sally Stipho MD
4060 Fourth Avenue, Suite 240 San Diego, California 92103
Telephone (6 19) 29 1-6064 FAX (619) 291-3078
www.sandiegogastro.com

Instrucciones para Endoscopia Superior y ERCP

Su procedimiento ha sido programado para _____

Hora de Entrada: _____ Hora del Procedimiento: _____

Por favor regístrese en:

● Scripps Mercy Hospital 4077 5th Avenue

Regístrese en la Radiología de Consulta externa en el PRIMER piso.

(Principal Outpatient Radiology) (619) 260-7026

● Centro de Endoscopia de San Diego (San Diego Endoscopy Center) 4033 Third Avenue
Ste.106 (619) 497-2888

Por favor siga éstas Instrucciones:

1. Suspenda todos los productos que contienen aspirina (Anacin, Excedrin, etc.) siete días antes de su procedimiento. Todo otro medicamento para artritis (Advil, Motrin, Aleve, etc.) debe ser suspendido 48 horas antes del procedimiento. Tylenol es un reemplazo aceptable para éstos dolores y medicaciones de artritis. Si usted es requerido de tomar una aspirina diariamente por su médico (es decir para enfermedad cardíaca, embolia prevención), este puede ser continuado.

2. Si usted toma **Coumadin** o **Plavix**, por favor póngase en contacto con el doctor inmediatamente para instrucciones. Usted puede tener que mantener estos medicamentos durante 5-7 días antes de su procedimiento.

3. Después de las 12:00 medianoche antes de su procedimiento no coma nada. Beba sólo agua. Pare de tomar agua tres horas antes de su procedimiento.

4. Por favor permita 2 1/2 horas para el procedimiento y arregle que alguien lo regrese a casa después de el procedimiento. Usted recibirá anestesia intravenosa y no será capaz de conducir durante 18 horas después de este procedimiento. POR FAVOR deje sus objetos de valor (excepto su tarjeta de seguros) en casa o con la persona que le acompaña. Usted necesitará su tarjeta de seguros.

5. Traiga una lista de toda su prescripciones medicas y las compradas sin receta médica.

6. Si usted toma insulina por favor tome 1/2 de su dosis habitual el día antes del procedimiento y no tome insulina hasta que el procedimiento sea terminado. Si usted toma pastillas para la diabetes, por favor no tome ninguna el día antes del procedimiento.

NOTE: Usted debe cancelar 2 días laborales de antemano para evitar cualquier cobro.